

WELL CHILD EXAM - EARLY CHILDHOOD: 3 YEARS

(Meets EPSDT Guidelines)

TE		

	兒童姓名			兒童由誰	帶來		出生日期	
r->	過敏症		+		目前用藥			
由家長填寫兒童的情況	自上次體檢後出現的病症/事故/問題/擔憂				今天我有一個不明白的問題,關於:			
由家長填寫	是 我的孩子飲食多樣化。 是 我的孩子飲食多樣化。 数的孩子知道自己的名字、年齡及性別。 我家中的人懂得我孩子所説的話。 □			吾	否 我的孩子能雙腳跳下一階樓梯。 我的孩晚上大部份時間都不尿床。 我孩子的視力和聽力都很好。			
WEIGHT KG./OZ. PERCENTILE HEIGHT CM/IN. PERCENTILE BLOOD PRESSURE			Di	et				
Re	eview of systems	Review of family	history					
Screening: MHZ R L			H6	Review Immunization Record Lead Exposure Review Immunization Record Lead Exposure Fluoride Supplements Fluoride Varnish Hct/Hgb TB Dental Referral Health Education: (Check all discussed/handouts given) Nutrition Child Care Development Regular Physical Activities Car Seat/Booster Seat Safety Discipline/Limits/Rules Books/Reading Passive Smoking Limit TV Friendship/Siblings Other Assessment/Plan:				
Describe abnormal findings and comments:				IMM	IMMUNIZATIONS GIVEN			
				REF	REFERRALS			
NEXT VISIT: 4 YEARS OF AGE			HEA	HEALTH PROVIDER NAME				
HEALTH	PROVIDER SIGNAT	TURE		HEA	LTH PROVIDER ADD	RESS		
DSHS 13-68	4B CH (REV. 08/2004)			-			SEE DICTATION	

DISTRIBUTION: White - Physician Yellow - Parent/Guardian

Guidance to Physicians and Nurse Practitioners for Early Childhood (3 years)

The following highlight EPSDT screens where practitioners often have questions. They are not comprehensive guidelines.

Fluoride Screen

Fluoride supplements should be considered for all children drinking fluoride deficient (<0.6 ppm F) water. Before supplements are prescribed, it is essential to know the fluoride concentration of the patient's drinking water. Once the fluoride level of the water supply has been evaluated, either through contacting the public health officials or water analysis, as well as evaluating other sources of fluoride, the daily dosage schedule can be recommended. Pediatric Dentistry: Reference Manual 1999–00.(21)5.

Tuberculosis Screen

Screen for these risk factors:

- Members of household with tuberculosis or in close contact with those who have the disease.
- Close contact with recent immigrants or refugees from countries in which tuberculosis is common (e.g., Asia, Africa, Central and South America, Pacific Islands); migrant workers; residents of correctional institutions or homeless shelters or persons with certain underlying medical disorders.

Developmental Milestones

Always ask about and follow-up on parent concerns about development or behavior. You may use the following screening list, or use the Ages and Stages Questionnaire, the Denver II, the ELMS2 (a language screen), or the MacArthur Communication Development Inventory.

Yes	No						
		Washes and dries hands.					
		Imitates vertical line.					
		Says what to do when tired, cold, hungry.					
		Names 4 animal pictures (e.g., cat, dog, bird, horse).					
		Identifies 2 animal pictures: "Which flies? Meows? Barks? Gallops?					
		Throws ball overhand.					
		Pedals tricycle.					
		Ask why?					
•	Persistent echolalia (repeating what was just said).						
•	Inappropriate play with toys/no pretend play.						
•	Any loss of language or social skills.						

Instructions for developmental milestones: At least 90% of children should achieve <u>the underlined milestones</u> by this age. If you have checked "no" on any two items, on *even one* of the underlined items, or one of the **boxed items** (abnormal behavior at this age), refer the child for a formal developmental assessment.

Notes: Immunization schedules are from the Advisory Committee on Immunization Practice of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Parents and providers may call Healthy Mothers, Healthy Babies (1-800-322-2588) with questions or concerns on childhood development.



保健服務機構簽名

健康兒童體檢 - 童年早期:3歳

WELL CHILD EXAM - EARLY CHILDHOOD: 3 YEARS (符合EPSDT早期定期檢查、診斷和治療指南標準)							
			年早期:				
	兒童姓名		兒童	由誰帶來			
	過敏症		-	目前用藥	,		
由家長填寫兒童的情況	自上次體檢後出現的症	府症/事故/問題/擔憂			今天我有一個不明白的問題,	關於:	
田家長墳	我的	孩子飲食多樣化。 孩子知道自己的名字、年齡及性別。 中的人懂得我孩子所説的話。	是	否 我的孩子能雙腳跳 我的孩晚上大部份 我孩子的視力和聽	時間都不尿床。		
體重 千克/	盎司 百分比	身高 厘米/英寸 百分比 血壓		飲食			
檢查: 聽力檢查	新羅核 新羅核	家族健康史審核 MHZ R L 4000 2000 1000	 [[排洩 睡眠 審核免疫記錄 氟化物藥品 Hct/Hgb ————————————————————————————————————	氟化物鈾劑	计中毒現象	
適應/ 認 大的肌! 行為 心理健!	請勾劃出您感到擔, 別知 內運動 社交/1 正	500 20/ 20/ 心的方面 語言/交流溝通	[● 営養		(平的項目)座椅/ 加固兒童車座書籍/ 閱讀交朋友/兄弟姊妹關係	
耳朵 鼻子 口咽/ 9 頸部 淋巴結	観 【 【 養蓋物/ 無覆蓋物) 【 【 【 】		常不正常				
				已完成的免疫接種			
				轉介			
下次檢查:4歲			1	保健服務機構名稱			

DSHS 13-684B CH (REV. 08/2004)

保健服務機構地址

参見口述記錄

3歲小兒的保健

重要標誌

小兒在3至4歲期間的生長發育。

可以唱簡單的歌曲。

告訴你他做過的事情。

知道自己的姓和名。

將9-10塊積木搭起來。

單腿蹦跳。

嘗試繪畫有幾個部位的人形(如頭、 身體、腿)。

與小朋友玩簡單的游戲,開始分享玩具。

玩簡單的拼圖游戲。

您可以在與您的孩子玩耍時幫助她學 會新技能。

若需要幫助或詳細資訊,請聯繫

學習嬰幼兒和兒童人工呼吸以及急救措施:

向當地的消防站或衛生部詢問是否提供此 培訓課。

嬰兒車座椅或兒童加固車座方面的疑問:

安全約束裝置聯盟,1-800-BUCK-L-UP(留言)或撥1-800-833-6388(TTY中繼轉發)。

免費發育檢查:健康母親、健康寶寶資訊和轉介專線1-800-322-2588(留言)或1-800-833-6388(TTY中繼轉發)。

子女教養技巧或支持:

家庭幫助專線 1-800-932-HOPE (4673) 西北地區家庭服務資源 1-888-746-9568當地社區學院課程

保健須知

水是一種健康的飲料。在您的孩子吃零食時應給她 喝水而不是甜味飲料。您的孩子每天仍需要大約兩 杯牛奶。

每天提供各種不同的水果和蔬菜。

每天幫助孩子刷牙。應使用含氟牙膏,牙膏用量應 為豆粒大小。至少每年帶他去做一次牙科檢查。

教您的孩子在玩耍、去洗手間後和吃飯前將手洗乾 凈。要用肥皂,並摩擦兩手大約20秒鐘。

子女教養須知

兒童最好的學習方式就是動手做。他們需要:

- 玩活動式的游戲(捉人游戲、球類、騎帶輪的玩具、攀爬)
- 玩培養想像力的游戲(利用布娃娃、模型玩具、故事書)
- 玩需要使用雙手的玩具(積木、大塊拼圖)

限制電視和電腦時間,每天不超過一小時。

每天為孩子閱讀。與他談論圖書和故事。

您是孩子最好的老師。她觀察您如何待人、吃飯、 運動、放松、使用安全帶及過馬路。她想和您一 樣。

安全須知

檢查家中是否有危險物。您的孩子還不夠大,因此 還不能避開那些會對她造成傷害的東西,如火柴、 槍枝和毒藥。把這些東西鎖好!

在您的孩子體重達40磅前應一直使用嬰兒車座椅。 之後,在達到80磅前,應使用兒童加固車座。將您 的孩子安置在車後座。

一定要讓他在騎三輪腳踏車、踏板車或其他帶輪玩 具時戴頭盔。